

# 院内登録レジメン 胃

	レジメン名	抗がん剤名(一般名)	用法用量	1クール
1	S-1+CDDP	S-1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)	経口投与 80mg/m <sup>2</sup> /日 分2朝夕食後 day1~day21	35日
		シスプラチン	点滴静注 60mg/m <sup>2</sup> day8	
2	SOX	S-1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)	経口投与 80mg/m <sup>2</sup> /日 分2朝夕食後 day1~day14	21日
		オキサリプラチン	点滴静注 100mg/m <sup>2</sup> day1	
3	Rmab+WeeklyPTX	ラムシルマブ	点滴静注 8mg/kg day1,day15	28日
		パクリタキセル	点滴静注 80mg/m <sup>2</sup> day1,day8,day15	
4	WeeklyPTX	パクリタキセル	点滴静注 80mg/m <sup>2</sup> day1,day8,day15	28日
5	Rmab+アブラキサン	ラムシルマブ	点滴静注 8mg/kg day1,day15	28日
		パクリタキセル(アルブミン結合型)	点滴静注 100mg/m <sup>2</sup> day1,day8,day15	
6	nab-Paclitaxel(毎週投与方法)	パクリタキセル(アルブミン結合型)	点滴静注 100mg/m <sup>2</sup> day1,day8,day15	28日
7	S-1+DOC	S-1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)	経口投与 80mg/m <sup>2</sup> /日 分2朝夕食後 day1~day14	21日
		ドセタキセル	点滴静注 40mg/m <sup>2</sup> day1	
8	S-1+DOC(術後補助療法)	S-1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)	経口投与 80mg/m <sup>2</sup> /日 分2朝夕食後 day1~day14	21日 (1~7クール)
		ドセタキセル	点滴静注 40mg/m <sup>2</sup> day1(2クール目より開始)	
		S-1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)	経口投与 80mg/m <sup>2</sup> /日 分2朝夕食後 day1~day28	42日 (8クール以降)
9	CPT-11+CDDP	イリノテカン	点滴静注 60mg/m <sup>2</sup> day1,day15	28日
		シスプラチン	点滴静注 30mg/m <sup>2</sup> day1,day15	
10	S-1+CDDP+HER	S-1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)	経口投与 80mg/m <sup>2</sup> /日 分2朝夕食後 day1~day21	35日
		シスプラチン	点滴静注 60mg/m <sup>2</sup> day8	
		トラスツズマブ	点滴静注 (初回)8mg/kg,(2回目以降)6mg/kg	3週間毎
11	S-1+HER(6週法)	S-1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)	経口投与 80mg/m <sup>2</sup> /日 分2朝夕食後 day1~day28	42日
		トラスツズマブ	点滴静注 (初回)8mg/kg,(2回目以降)6mg/kg day1,day22	
12	S-1+HER(3週法)	S-1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)	経口投与 80mg/m <sup>2</sup> /日 分2朝夕食後 day1~day14	21日
		トラスツズマブ	点滴静注 (初回)8mg/kg,(2回目以降)6mg/kg day1	
13	S-1+PTX	S-1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)	経口投与 80mg/m <sup>2</sup> /日 分2朝夕食後 day1~day14	21日
		パクリタキセル	点滴静注 50mg/m <sup>2</sup> day1,day8	
14	CPT-11単独	イリノテカン	点滴静注 150mg/m <sup>2</sup> day1,day15	28日
15	IRIS	S-1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)	経口投与 80mg/m <sup>2</sup> /日 分2朝夕食後 day1~day21	35日
		イリノテカン	点滴静注 80mg/m <sup>2</sup> day1,day15	

## 院内登録レジメン 胃

16	ニボルマブ	ニボルマブ	点滴静注 240mg/body day1	14日
17	ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	点滴静注 200mg/body day1	21日